

## Informationen zur Behandlung mit Lachgas (Stickoxydul)

### Was ist Stickoxydul?

Im Allgemeinen bekannt unter dem Namen Lachgas, ist Stickoxydul ein nicht allergenes, nicht reizendes Gas, welches das zentrale Nervensystem beeinflusst. Die Zahnmedizin nutzt Lachgas vor allem zur Behandlung ängstlicher Patienten.

### Wie wirkt Lachgas?

Über eine kleine Nasenmaske wird ein Gemisch aus Sauerstoff und Lachgas verabreicht. Das hilft Ihnen, sich bei der Zahnarztbehandlung entspannen zu können und Angstgefühle zu reduzieren. Ebenso wie die Angst nimmt auch die Schmerzempfindlichkeit ab. Dabei sind Sie aber jederzeit ansprechbar.

Die Wirkung von Lachgas ist nach der Behandlung innerhalb weniger Minuten komplett aufgehoben, so dass Sie die Praxis ohne Begleitperson wieder verlassen können.

### Was fühlt man?

Patienten beschreiben das Gefühl der Lachgassedierung als

- Kribbeln der Hände und Füße Wärmegefühl
- Verkürztes Zeitempfinden
- Tiefe Entspannung
- Gefühl der Leichtigkeit oder Schwere

In seltenen Fällen kann es zu einem leichten Übelkeitsgefühl kommen. Bitten Sie den Zahnarzt in diesem Fall, die Verabreichung von Lachgas zu reduzieren oder ganz zu beenden.

### Risiken bei einer Lachgassedierung

Die Lachgassedierung ist ein sehr sicheres und komplikationsarmes Verfahren, das weltweit millionenfach angewendet wird. Sehr selten kann es zu Übelkeit kommen. Es gibt nur wenige Gegenanzeigen die eine Lachgassedierung ausschließen. Diese kann der Zahnarzt in dem Vorgespräch sehr gut identifizieren. Die Patientenauswahl ist sehr sicher und Risiken können ausgeschlossen werden .

Für schwangere Patientinnen ist die Lachgassedierung nicht geeignet.

Während der Lachgassedierung sollten Schwangere nicht mit im Behandlungsraum sein.

#### **Wichtig ist,**

dass wir vor der Behandlung Ihren Gesundheitszustand kennen. Daher informieren Sie uns bitte über alle Medikamente, die Sie einnehmen, Drogen, Alkohol oder Beruhigungsmittel/Betäubungsmittel und über bestehende Krankheiten und Operationen.

#### **Empfohlen wird,**

vor der Behandlung eine leichte Mahlzeit einzunehmen und etwa 2 Stunden vor dem Termin nichts zu essen oder zu trinken.

PRAXISKLINIK  DR. BÖNSEL